

**Capture d'*Idiurus zenkeri* Matschie 1894 (Rangeurs, Anomaluridés)
dans la région de La Maboké (République Centrafricaine)**

par Francis PETER



Les *Idiurus* sont les plus petits représentants de la famille des Anomaluridés, de répartition strictement africaine. Ces rongeurs, improprement appelés « écureuils volants africains », sont mal connus, et le genre *Idiurus*, en particulier, n'est représenté dans les collections des Musées que par de très rares spécimens. La capture d'un *Idiurus* dans la région de La Maboké présente donc un réel intérêt.

D'après les données de la littérature et les collections du British Museum de Londres, Hayman (1946) a tenté une révision du genre et a fait le point de nos connaissances concernant la répartition des trois espèces qu'il reconnaît :

I. zenkeri Matschie 1894, décrite de Yaoundé, Cameroun (3° 51' N 11° 31' E), est la plus petite espèce. Elle est également connue de l'Est du Congo : Medjé (2° 25' N 27° 18' E), Avakubi (1° 18' N 27° 35' E), Niapu (2° 25' N 26° 31' E) où elle est représentée par la forme type.

I. macrotis Miller 1898, décrite d'Efulen, Cameroun, près de la frontière de Guinée espagnole (2° 46' N 10° 42' E), est la plus grande espèce. Elle est représentée dans la forêt de l'Ituri par une sous-espèce qui se distingue de la forme type par sa coloration *I. m. langi* J.A. Allen 1922. Elle a également été trouvée à Medjé.

I. kivuensis Lönnberg 1917, décrite de Masisi (1° 25' S 28° 50' E), 40 miles au N-W du lac Kivu, est de dimensions intermédiaires. La forme type est connue de Mamlé au Cameroun (5° 45' N 9° 18' E). Cette espèce est représentée par deux sous-espèces qui se distinguent par des caractères de pigmentation :

I. k. panga J.A. Allen 1922 décrite de Panga (1° 52' N 26° 23' E), dans la forêt de l'Ituri.

I. k. cansdalei Hayman 1946, décrite de Oda, Ghana (5° 55' N 0° 56' W).

Le spécimen d'*Idiurus* capturé à La Maboké (4° N 18° E) est référable sans ambiguïté à *Idiurus zenkeri*. Il s'agit d'un adulte et ses mensurations sont comparables à celles des autres spécimens connus de cette espèce :

Mensurations extrêmes du crâne des spécimens du British Museum	Spécimen de La Maboké
Longueur totale : 20 - 21,8	21,5
Largeur bi-zygomatique : 11,9 - 13	12,4
Rangée molaire supérieure : 2,4 - 2,8	2,5

Il faut signaler l'existence dans les collections du Muséum d'une peau sans crâne, vraisemblablement référable à *Idiurus macrotis*, provenant de Boué, au Gabon (3° S 11° 58' E).

BIBLIOGRAPHIE

HAYMAN (R.W.), 1947. — Systematic notes on the Genus *Idiurus*. *Ann. Mag. Nat. Hist.* 13 : 208-212.

